

全国 2019 年 4 月高等教育自学考试
儿科护理学(一)试题
课程代码:03003

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列不属于青春期特点的是
 - A. 第二性征出现,生殖器官发育成熟
 - B. 认知、心理社会和行为发展
 - C. 内分泌不稳定,面对更多社会压力
 - D. 体格生长缓慢进行
2. 某小儿 1 周岁,生长发育正常,其身长约为
 - A. 70cm
 - B. 75cm
 - C. 80cm
 - D. 85cm
3. 某小儿,女,12 个月,其乳牙数目约是
 - A. 2~4 个
 - B. 4~6 个
 - C. 6~8 个
 - D. 8~10 个
4. 小儿前囟凹陷见于
 - A. 脱水
 - B. 脑肿瘤
 - C. 脑积水
 - D. 脑膜炎
5. 初乳中含有较多的
 - A. 铁元素
 - B. 矿物质
 - C. 饱和脂肪酸
 - D. 免疫因子
6. 关于预防接种注意事项的描述,错误的是
 - A. 严格消毒制度,预防感染
 - B. 严格掌握禁忌证
 - C. 出现局部或全身反应,不必处理
 - D. 做好宣传和解释工作,取得合作
7. 光照疗法时,最有效的蓝色荧光灯的波长为
 - A. 320~370nm
 - B. 370~420nm
 - C. 420~470nm
 - D. 470~520nm
8. 出生体重在同胎龄儿平均体重的第 90 个百分位以上的新生儿,称为
 - A. 小于胎龄儿
 - B. 大于胎龄儿
 - C. 巨大儿
 - D. 适于胎龄儿

9. 新生儿可通过胎盘从母体获得的免疫物质是
A. IgG B. IgM C. SIgA D. IgE
10. 关于早产儿消化功能的描述,错误的是
A. 吸吮能力差 B. 吞咽反射弱
C. 贲门括约肌松弛 D. 胃酸及消化酶多
11. 新生儿发生肺透明膜病的主要原因是
A. 低出生体重儿 B. 高危儿
C. 孕母患肺部疾病 D. 缺少肺表面活性物质
12. 新生儿脓疱病的病原体是
A. 化脓性细菌 B. 疱疹病毒 C. 链球菌 D. 支原体
13. I 度营养不良患儿腹部皮下脂肪层厚度是
A. 0.8 ~ 1.2cm B. 0.4 ~ 0.8cm C. 0.4cm 以下 D. 基本消失
14. 下列不属于佝偻病激期表现的是
A. 肌张力恢复 B. 颅骨软化 C. “O”型腿 D. 骨干密度减低
15. 小儿右支气管的特点是
A. 较长、狭窄,呈漏斗形 B. 粗而短
C. 较宽,呈水平位 D. 纤毛较多
16. 胸腔或脓气胸时气管可
A. 偏向患侧 B. 偏向健侧 C. 仍居中 D. 左右摇摆
17. 低钾血症定义为血清钾低于
A. 3.3mmol/L B. 3.4mmol/L C. 3.5mmol/L D. 3.6mmol/L
18. 小儿最常见的酸碱平衡紊乱类型是
A. 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒
C. 呼吸性酸中毒 D. 呼吸性碱中毒
19. 卵圆孔解剖上的闭合时间大约为出生后
A. 3 ~ 4 个月 B. 3 ~ 5 个月 C. 5 ~ 6 个月 D. 5 ~ 7 个月
20. 目前已被公认的引起绝大多数病毒性心肌炎的病原体是
A. 麻疹、风疹病毒 B. 水痘、肝炎病毒
C. 腮腺炎病毒 D. 柯萨奇、埃克病毒
21. 为了观察化疗药物抑制骨髓情况,需定期复查
A. 血象 B. 尿常规 C. 肾功 D. 肝功
22. 营养性缺铁性贫血的主要原因是
A. 铁的贮存不足 B. 铁的摄入不足
C. 生长发育快 D. 铁的丢失过多
23. 不属于小儿原发性肾病综合征特点的是
A. 高血压 B. 大量蛋白尿
C. 高胆固醇血症 D. 不同程度的水肿

24. 急性肾炎患儿起病时,几乎都有
A. 血尿 B. 高血压 C. 水肿 D. 尿少
25. 儿童糖尿病最常见的合并症是
A. 腹痛 B. 关节痛 C. 酸中毒 D. 低血糖
26. 过敏性紫癜患儿如出现消化道出血,应给予
A. 少渣饮食 B. 流食 C. 半流食 D. 禁食
27. 甲状腺功能减低症患儿给予甲状腺制剂替代治疗,其治疗时间为
A. 1年 B. 3年 C. 5年 D. 终生
28. 流脑患儿服用磺胺药物时,为了碱化尿液,需用等量的
A. 碳酸氢钠 B. 青霉素 C. 氯霉素 D. 甘露醇
29. 下列结核病治疗原则错误的是
A. 早期 B. 联合 C. 适量 D. 间断
30. 小儿心脏按压应使胸骨下陷
A. 1~2cm B. 2~3cm C. 3~4cm D. 4~5cm

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。

31. 出牙时个别小儿可出现_____、流涎、睡眠不安、_____等反应。
32. 小儿肺炎合并肺水肿时可吸入经 20% ~ 30% _____ 湿化的氧气,每次吸入时间不宜超过_____分钟。
33. 低渗性脱水时,电解质的丢失_____于水分的丢失,血清钠浓度低于_____ mmol/L。
34. 缺铁性贫血患儿外周血涂片可见红细胞大小不等,以_____细胞为多,中央淡染区_____。
35. 遗传的物质基础是_____. _____ 在遗传性的传递中起着重要作用。

三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 学龄期
37. 控制感丧失
38. 腹泻病
39. 营养性巨幼红细胞性贫血
40. 幼年类风湿性关节炎

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

41. 幼儿期保健重点。
42. 小儿充血性心力衰竭的主要护理措施。
43. 急性肾炎患儿的休息原则。
44. 急性感染性多发性神经根神经炎的主要临床表现。
45. 急性中毒患儿的护理措施。

五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

46. 防止维生素 D 缺乏性手足搐搦症患儿窒息的护理措施。
47. 患儿,女,4 个月,口周明显青紫,经常在吸乳、哭闹后出现阵发性呼吸困难,同时伴有青紫加重,胸骨左缘第 2 - 4 肋间可闻及 II - III 级喷射性收缩期杂音,心脏彩超显示主动脉径向右移位,右心室内径增大,流出道狭窄,右心室直接将血液注入骑跨的主动脉。确诊为法洛四联症。请问:
 - (1)患儿主要的护理问题有哪些? (2 分)
 - (2)应采取哪些护理措施? (8 分)